

## ESQUEMA DE VACUNACIÓN NO PAI

Edad	NOMBRE DE VACUNA COMERCIAL	Me Protege de	Dosis	ENFERMEDAD PREVENIBLE	VIA DE APLICACIÓN
Recién Nacidos		Tuberculosis BCG	Única	MENINGITIS TUBERCULOSA	INTRADERMICA:region escapular izquierda
		Hepatitis B	Recién Nacidos	HEPATITIS-B	intramuscular: region anterolateral, muslo.
2 Meses	INFARIX HEXA/ HEXAXIM	Difteria, Tosferina, Tétano(DPT)	1ra	Difteria, Tosferina, Tétano- MENINGITIS Y OTROS. CAUSADAS POR HAEMOFILUS TIPO B - HB- POLIOMELITIS.	INTRAMUSCULAR: REGION ANTEROLATERAL,MUSLO.
		Haemophilus influenza tipo B (Hib)	1ra		
		Hepatitis B (Hib)	1ra		
		Polio	1ra		
	ROTATEQ	Rotavirus	1ra	DIAREA, GASTROENTERITIS X ROTAVIRUS	VIA ORAL
PREVENAR/ SYNFLORIX	Neumococo	1ra	MENINGITIS, MEUMONIA,OTITIS MEDIA, SEPTICEMIA.	INTRAMUSCULAR: REGION ANTEROLATERAL,MUSLO.	
4 Meses	INFARIX HEXA/ HEXAXIM	Difteria, Tosferina, Tétano(DPT)	2da	Difteria, Tosferina, Tétano- MENINGITIS Y OTROS. CAUSADAS POR HAEMOFILUS TIPO B - HB- POLIOMELITIS.	INTRAMUSCULAR: REGION ANTEROLATERAL,MUSLO.
		Haemophilus influenza tipo B (Hib)	2da		
		Hepatitis B (Hib)	2da		
	ROTATEQ	Rotavirus	1ra	DIAREA, GASTROENTERITIS X ROTAVIRUS	VIA ORAL
	PREVENAR/ SYNFLORIX	Neumococo	1ra	MENINGITIS, MEUMONIA,OTITIS MEDIA, SEPTICEMIA.	INTRAMUSCULAR: REGION ANTEROLATERAL,MUSLO.

6 Meses	INFARIX HEXA/ HEXAXIM	Difteria, Tosferina, Tétano(DPT)	2da	Difteria, Tosferina, Tétano- MENINGITIS Y OTROS. CAUSADAS POR HAEMOFILUS TIPO B - HB- POLIOMELITIS.	INTRAMUSCULAR: REGION ANTEROLATERAL,MUSLO.	
		Haemophilus influenza tipo B (Hib)	2da			
		Hepatitis B (Hib)	2da			
		Polio	2da			
ROTATEQ	Rotavirus		1ra	DIAREA, GASTROENTERITIS X ROTAVIRUS	VIA ORAL	
PREVENAR/ SYNFLORIX	Neumococo		1ra	MENINGITIS, MEUMONIA,OTITIS MEDIA, SEPTICEMIA.	INTRAMUSCULAR: REGION ANTEROLATERAL,MUSLO.	
7 Meses	AGRIPAL/FLUQUADRI	Influenza estacional		2da	VIRUS INFLUENZA	INTRAMUSCULAR: REGION ANTEROLATERAL, MUSLO.
9 Meses	MENACTRA	MENINGOCOCO		1ra	MENINGOCOCO	INTRAMUSCULAR: REGION ANTEROLATERAL, MUSLO.
12 Meses	PRIORIX	Sarampión, Rubéola, Paperas(SRP)		1era	SARAMPION, RUBEOLA, PAROTIDITIS	SUB-CUTANEA, TERCIO MEDIO DEL BRAZO
	VARILRIX	Varicela		2da	VARICELA	SUB-CUTANEA, TERCIO MEDIO DEL BRAZO
	PREVENAR/ SYNFLORIX	Neumococo		2da	MENINGITIS, MEUMONIA,OTITIS MEDIA, SEPTICEMIA.	INTRAMUSCULAR: REGION ANTEROLATERAL, MUSLO.
	AVAXIM 80	Hepatitis A		1ra	HEPATITIS-A	INTRAMUSCULAR: REGION ANTEROLATERAL, MUSLO.

	MENACTRA	MENINGOCOCO	1ra	MENINGOCOCO	INTRAMUSCULAR: REGION ANTEROLATERAL,MUSLO.
18 Meses	PENTANXIM	Difteria, Tosferina, Tétano(DPT)	1er Refuerzo	DIFTERIA TETANO,TOSFERINA- ANTIPOLIOMELITIS VIP.MENINGITIS Y OTRAS CAUSADAS POR HAEMOPHILUS TIPO B	INTRAMUSCULAR: REGION ANTELORATERAL,MUSLO.
		Polio	1er Refuerzo		
	STAMARIL	Fiebre Amarilla	1er	FIEBRE AMARILLA	SUB-CUTANEA, TERCIO MEDIO DEL BRAZO
5 Años	TETRAXIM	Difteria, Tosferina, Tétano(DPT)	2da	DIFTERIA TETANO,TOSFERINA- ANTIPOLIOMELITIS VIP.	INTRAMUSCULAR: REGION ANTELORATERAL,MUSLO.
		Polio	2da		
	TRIPLE VIRAL	Sarampión, Rubéola, Paperas(SRP)	2da	SARAMPION, RUBEOLA, PAROTIDITIS	SUB-CUTANEA, TERCIO MEDIO DEL BRAZO
DESPUES 5 AÑOS	NEUMO 23	Neumococo	1 ra	MENINGITIS, MEUMONIA,OTITIS MEDIA, SEPTICEMIA.	NTRAMUSCULAR: REGION ANTELORATERAL,MUSLO.
ENTRE LOS 10-49 AÑOS	TETANO	TETANO	MUJERES 5 DOSIS, MUJERES EMBARAZADAS 2 DOSIS, HOMBRE 2 DOSIS. CADA 10 AÑOS	DIFTERIA-TETANO- (TETANO-TOSFERINA)	INTRAMUSCULAR: TERCIO MEDIO BRAZO.
A PARTIR 11 AÑOS HASTA 64 AÑOS	ADACEL	DPT: CELULAR DIFTERIA TETANO Y TOS FERINA	1RA EMBARAZADAS: 2 DOSIS CADA 10 AÑOS	DIFTERIA TETANO Y TOS FERINA	SUB-CUTANEA, TERCIO MEDIO DEL BRAZO

POS-PARTYO Y PO-ABORTO INMEDIATO	TRIPLE VIRAL	RUBEOLA,SARAMPION Y PAPERAS.	DOSIS UNICA	RUBEOLA-SINDROME DE RUBEOLA CONGENITA	SUB-CUTANEA, TERCIO MEDIO DEL BRAZO
10 AÑOS DESPUES DE LA 1ra DOSIS	STAMARIL	Fiebre Amarilla	CADA 10 AÑOS	FIEBRE AMARILLA	SUB-CUTANEA, TERCIO MEDIO DEL BRAZO
ADULTO	TYPHIM VI	FIEBRE TIROIDEA	1ra DOSIS REFUERZO CADA 10 AÑOS	FIEBRE TIROIDEA	INTRAMUSCULAR: TERCIO MEDIO BRAZO.
MUJERES Y HOMBRES DE 9 A 55 AÑOS	GARDASIL	VIRUS DE PAPILOMA HUMANO	1ra 2da 3ra	cancer cuello uterino y verrugas genitales	INTRAMUSCULAR: TERCIO MEDIO BRAZO
MUJERES DE 9 A 55 AÑOS	CERVARIX	VIRUS DE PAPILOMA HUMANO	1ra 2da 3ra	cancer cuello uterino.	INTRAMUSCULAR: TERCIO MEDIIO BRAZO