



EFECTOS SECUNDARIOS A LA VACUNACIÓN

VACUNARTE ES UN ACTO DE AMOR Y RESPONSABILIDAD



Reacciones Adversas relacionadas con la vacunación

Reacción relacionada con el contenido de la vacuna

Es la reacción causada por uno o mas componentes o propiedades de la vacuna, como por ejemplo enrojecimiento, dolor y adormecimiento del sitio inyectado

Reacción relacionada con la ansiedad de la vacunación

Reacción causada por la ansiedad por la vacunación, antes durante o después de la misma, por ejemplo, miedo, nervios y desmayo

POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS MAS COMUNES DESPUÉS DE VACUNARSE CONTRA EL COVID-19

*En el brazo donde recibió la vacuna
inyectable:*

- Dolor
- Enrojecimiento
- Hinchazón



En el resto del cuerpo:



- Cansancio
- Dolor de cabeza
- Dolor muscular
- Escalofríos
- Fiebre
- Náuseas

CUANDO DEBEMOS ACUDIR AL MEDICO

En la mayoría de los casos, la molestia a causa del dolor o fiebre son un signo normal de que su organismo está generando protección. Comuníquese con su médico si:

- Si la irritación o sensibilidad en la zona de la inyección empeoran pasadas las 24 horas
- Si sus efectos secundarios le preocupan o parecen no estar desapareciendo al cabo de algunos días

CONSEJOS UTILES

Si siente dolor o molestias después de vacunarse, pregúntele a su médico si puede tomar un medicamento, como acetaminofen.

Además te recomendamos no tocar, no rascar, no masajear la zona donde te aplicaron la vacuna

Para reducir el dolor o molestia en el lugar donde se le aplicó la inyección:

- Use o ejercite el brazo.



Para reducir la molestia causada por la fiebre



- Tome mucho líquido.
- No se abrigue mucho

"Las vacunas son Tú mejor defensa."

